**TÍTULO: SARCOMA EWING PRIMARIO INTRADURAL EXTRAMEDULAR: REVISIÓN LITERARIA A PROPÓSITO DE UN CASO**

**INTRODUCCIÓN/OBJETIVOS:** El sarcoma de Ewing es el segundo tumor óseo maligno más frecuente en niños y adolescentes. El compromiso de la columna vertebral intradural extramedular primaria (PIEES) es notablemente raro, se han identificado aproximadamente 50 casos documentados hasta el año 2025. El objetivo de este trabajo es realizar una revisión literaria de las últimas publicaciones además de presentar un caso tratado en nuestro centro.

**MATERIAL Y MÉTODOS:** Revisión literaria de la bibliografía publicada en la base de datos *Pubmed* desde el 2018 hasta la actualidad. Presentación de un caso tratado en nuestro centro.

**RESULTADOS:** El sarcoma de Ewing intradural presenta una edad mediana de 31 años (rango de 5 a 70 años). Existe predominancia masculina en un 65%. El 61% de los tumores PIEES se localizan en la región lumbosacra. El síntoma inicial más frecuente es el dolor persistente y localizado que a menudo empeora por la noche. El tratamiento es multimodal e intensivo incluyendo cirugía con intención resección total, quimioterapia y radioterapia para el control local. El pronóstico de las variantes espinales intradurales es generalmente pobre, la supervivencia a 5 años es del 40%, la mediana de tiempo hasta la progresión es de 12 meses. Alta tasa de recurrencia entre el 46% y el 63% de los casos. Se expone el caso de una paciente femenina de 14 años que presenta LOE sacra intradural diagnosticada de sarcoma Ewing tratada en nuestro centro.

**CONCLUSIONES:** La presentación intradural extramedular del sarcoma de Ewing es muy infrecuente, presenta características, clínica, evolución, tratamiento y pronóstico diferente al sarcoma de Ewing óseo, de ahí la importancia de continuar con el estudio y reportar globalmente los casos tratados.